

Registrácia v Českej republike

Rozšírené použitie prípravku (povolené na základe §37 odst.1 zákona č. 326/2004 Sb.)

plodina	škodlivý organizmus	dávkování, míšitelnost	OL	poznámka
Mák setý	Helminthosporioza Plíseň maková	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	0	1. a 2. aplikace ve fázi BBCH 12-19 3. aplikace do fáze BBCH 51
Jahodník	Plíseň šedá Fytoftorová hniloba	5g/300-500m ² v 15-50 l vody	0	Počet aplikací neomezen
Jahodník	Červená hniloba Fytoftorová hniloba	0,05 %	0	Máčení sazenic před výsadbou, pásová závlhka po výsadbě. Počet aplikací 1x
Okurka	Houbové choroby	5 g/kg	0	Suché moření osiva
Okurka	Houbové choroby	0,05 % (5 ml/rostlina)	0	Závlhka
Okurka	Plíseň okurková	5g/300-500m ² v 15-50 l vody	0	Závlhka. Počet aplikací neomezen.
Chmel	Plíseň chmelová	5g/300-500m ² v 15-50 l vody	0	Způsob aplikace: rosení nebo postřik. Termín ošetření od počátku rašení. Počet aplikací neomezen v intervalech 5-7dní podle potřeby.
Chmel	Houbové choroby kořenáčů	0,05 %	0	Máčení kořenáčů před výsadbou. Závlhka po výsadbě. Počet aplikací 1x (máčení), neomezen (závlhka)
Vinná réva	Houbové choroby sazenic	0,05 %	0	Máčení sazenic před výsadbou. Závlhka po výsadbě. Počet aplikací 1x (máčení), neomezen (závlhka)
Vinná réva	Plíseň šedá, plíseň révová	5g/300-500m ² v 15-50 l vody	AT	Postřik; v systémech ekologického zemědělství
Paprika	Houbové choroby	5 g/kg osiva	AT	Moření
Paprika	Houbové choroby	0,05 %	AT	Máčení, závlhka sazenic před výsadbou
Paprika	Houbové choroby	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	AT	Postřik, závlaha, dávka dle předpokládaného napadení
Rajče	Houbové choroby	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	AT	Moření osiva
Rajče	Houbové choroby	0,05 %	AT	Máčení kořenů před výsadbou
Rajče	Houbové choroby	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	AT	Postřik, závlhka Postřik jen při vzházení
Zelenina	Houbové choroby	5 g/kg osiva	AT	Moření osiva
Zelenina	Houbové choroby	0,05 %	AT	Máčení kořenů před výsadbou
Zelenina brukvovitá	Alternariová skvrnitost brukvovitých, Fomová hniloba brukvovitých, Plíseň zelná	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	AT	Závlhka, postřik při vzházení
Hořčice	Sklerociinová hniloba Plíseň šedá, Černá řepková	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	0	Způsob aplikace: postřik (pozemní). Termín ošetření od 1. páru pravých listů. Počet aplikací neomezen v intervalech 5-7 podle potřeby
Slunečnice	Hlízenka obecná, Plíseň šedá Alternariová skvrnitost	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	0	Způsob aplikace: postřik (pozemní). Termín ošetření od 1. páru pravých listů. Počet aplikací neomezen v intervalech 5-7 podle potřeby
Travníky golfové, Travníky okrasné	Houbové choroby	5 g/kg osiva	AT	Moření osiva
Travníky golfové, Travníky okrasné	Houbové choroby	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	AT	Postřik, závlaha
Školky lesních a okrasných dřevin	Houbové choroby	5 g/kg osiva	AT	Moření osiva
Školky lesních a okrasných dřevin	Houbové choroby	0,05 %	AT	Máčení kořenů
Školky lesních a okrasných dřevin	Houbové choroby	5g/300-500m ² v 10-20 l vody	AT	Postřik, závlhka

AT = 0 = nevyžaduje ochranou lhůtu mezi posledním ošetřením a sklizní.

Balení: 5g sáček PET/MET v papírové krabičce